

## NAVODILO ZA UPORABO

**Coupet 5 mg filmsko obložene tablete**  
**Coupet 10 mg filmsko obložene tablete**  
**Coupet 20 mg filmsko obložene tablete**  
**Coupet 40 mg filmsko obložene tablete**

rosuvastatin

### **Pred začetkom jemanja natančno preberite navodilo!**

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
- Zdravilo je bilo predpisano vam osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi lahko celo škodovalo, čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim.
- Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

### **Navodilo vsebuje:**

1. Kaj je zdravilo Coupet in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Coupet
3. Kako jemati zdravilo Coupet
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Coupet
6. Dodatne informacije

## **1. KAJ JE ZDRAVILO COUPET IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO**

Zdravilo Coupet spada v skupino zdravil, imenovanih statini (zaviralci reduktaze HMG-CoA).

Zdravnik vam je predpisal zdravilo Coupet, ker:

- imate **visok holesterol**. To pomeni, da vas lahko **ogrožata srčni infarkt ali možganska kap**.

Zdravnik vam je svetoval jemanje statina, ker sprememba prehrane in povečanje telesne dejavnosti pri vas nista zadoščala za ureditev ravni holesterola. Med jemanjem zdravila Coupet morate še naprej upoštevati dieto za zniževanje holesterola in biti telesno dejavni.

Ali

- Imate druge dejavnike, ki povečujejo tveganje za srčni infarkt, možgansko kap ali z njima povezane zdravstvene težave.

Srčni infarkt, možgansko kap in druge težave lahko povzroči bolezen, imenovana ateroskleroza. Ateroskleroza je posledica nalaganja maščob v vaših krvnih žilah.

### **Zakaj je pomembno, da nadaljujete z jemanjem zdravila Coupet?**

Zdravilo Coupet uporabljamo za uravnavanje ravni maščobnih snovi, imenovanih lipidi, v krvi. Najbolj običajna med temi snovmi je holesterol.

V krvi sta različni vrsti holesterola – ‘slabi’ holesterol (holesterol v lipoproteinih nizke gostote ali holesterol LDL) in ‘dobri’ holesterol (holesterol v lipoproteinih visoke gostote ali holesterol HDL).

- Zdravilo Coupet lahko zniža "slabi" holesterol in zviša "dobri" holesterol.
- Deluje tako, da zavira nastajanje ‘slabega’ holesterola in izboljša sposobnost telesa, da ga odstrani iz krvi.

Pri večini ljudi visok holesterol ne vpliva na počutje, ker ne povzroča nobenih simptomov. Toda če ostane nezdravljen, se lahko v stenah žil nakopičijo maščobni odložki in povzročijo zoženje žil.

Tako zožene žile se včasih zamašijo. To lahko prekine dotok krvi v srce ali možgane; posledica je srčni infarkt ali možganska kap. Če znižate holesterol, lahko zmanjšate tveganje za srčni infarkt, možgansko kap ali z njima povezane zdravstvene težave.

Zdravilo Coupet **morate jemati še naprej**, tudi če vam je že ustrezno znižalo holesterol, ker **preprečuje, da bi se holesterol znova zvišal** in povzročil kopičenje maščob. Nehajte pa ga jemati, če vam tako naroči zdravnik ali če zanosite.

## 2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE VZELI ZDRAVILO COUPET

### Ne uporabljajte zdravila Coupet

- če ste **alergični** (preobčutljivi) **na rosuvastatin** ali katerokoli sestavino zdravila Coupet
- če imate **bolezen jeter**
- če imate **hude težave z ledvicami**
- če imate **ponavljajoče se ali nepojasnjene bolečine v mišicah** (miopatija)
- če jemljete zdravilo, imenovano **ciklosporin** (uporablja se npr. po presaditvi organov)
- če ste **noseči ali dojite (glejte poglavje Nosečnost in dojenje)**. Če se karkoli od navedenega nanaša na vas (ali če ste v dvomih), **pojdite nazaj k zdravniku**.

### Prav tako ne jemljite 40 mg odmerka zdravila Coupet (največjega odmerka)

- če ste imeli **kakršnekoli ponavljajoče se ali nepojasnjene bolečine v mišicah** (miopatija), če ste imeli sami ali kdo iz vaše družine v preteklosti kdaj težave z mišicami, ali če ste imeli kdaj prej težave z mišicami med jemanjem drugih zdravil za zniževanje holesterola
  - če imate **zmerne težave z ledvicami** (če ste v dvomih, se posvetujte z zdravnikom)
  - če vam **žleza ščitnica** ne deluje pravilno
  - če **redno pijete velike količine alkoholnih pijač**
  - če za znižanje holesterola jemljete **druga zdravila, imenovana fibrati**
  - če ste **azijskega porekla** – (Japonec, Kitajec, Filipinec, Vietnamec, Korejec ali Indijec).
- Če se karkoli od navedenega nanaša na vas (ali če ste v dvomih), **pojdite nazaj k zdravniku**.

### Bodite posebno pozorni pri uporabi zdravila Coupet

- če imate **težave z ledvicami**
- če imate **težave z jetri**
- če imate **hudo dihalno odpoved**
- če ste imeli **kakršne koli ponavljajoče se ali nepojasnjene bolečine v mišicah (miopatija)**, če ste imeli sami ali kdo iz vaše družine v preteklosti kdaj težave z mišicami, ali če ste imeli kdaj prej težave z mišicami med jemanjem drugih zdravil za zniževanje

holesterola. Takoj obvestite zdravnika, če imate nepojasnjene bolečine v mišicah, še zlasti, če se ne počutite dobro ali imate povišano telesno temperaturo

- če **redno pijete velike količine alkoholnih pijač**
- če vam **žleza ščitnica** ne deluje pravilno
- če za znižanje holesterola jemljete **druga zdravila, imenovana fibrati**
- če jemljete **zdravila, ki se uporabljajo proti okužbi z virusom HIV** (npr. lopinavir, ritonavir), glejte poglavje Jemanje drugih zdravil
- če ste **starejši od 70 let** (saj mora zdravnik izbrati tak začetni odmerek zdravila Coupet, ki vam najbolj ustreza)
- če ste **azijskega porekla** – Japonec, Kitajec, Filipinec, Vietnamec, Korejec ali Indijec. Vaš zdravnik mora izbrati tak začetni odmerek zdravila Coupet, ki vam najbolj ustreza.
- če je bolnik **mlajši od 10 let**: otroci, mlajši od 10 let, ne smejo dobivati zdravila Coupet
- če je bolnik **mlajši od 18 let**: otroci in mladostniki, mlajši od 18 let, ne smejo dobivati zdravila Coupet 40 mg

Če kaj od naštetega velja za vas (ali če ste v dvomih):

**Ne jemljite zdravila Coupet 40 mg (največjega odmerka) in se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom, preden začnete jemati katerikoli odmerek zdravila Coupet.**

Pri malem številu bolnikov lahko statini prizadenejo jetra. To je mogoče ugotoviti s preprosto preiskavo, ki odkrije zvišanje ravni jetrnih encimov v krvi. Zaradi tega bo zdravnik to preiskavo krvi (test delovanja jeter) praviloma opravil pred in med zdravljenjem z zdravilom Coupet.

### **Jemanje drugih zdravil**

Obvestite svojega zdravnika ali farmacevta, če jemljete ali ste pred kratkim jemali katera koli druga zdravila, vključno z zdravili, ki so na voljo brez recepta.

Zdravniku morate povedati, če jemljete katero od naslednjih zdravil:

- **ciklosporin** (uporablja se npr. po presaditvi organov)
- **varfarin** ali katero koli drugo zdravilo za redčenje krvi
- **fibrate in druga zdravila za zniževanje holesterola** (na primer gemfibrozil, fenofibrat)
- **katerokoli drugo zdravilo za zniževanje holesterola** (na primer ezetimib)
- **zdravila proti želodčnim težavam** (uporabljajo se za nevtralizacijo kisline v želodcu)
- **eritromicin** (antibiotik)
- **peroralno kontracepcijsko sredstvo** (kontracepcijske tablete)
- **hormonsko nadomestno zdravljenje ali lopinavir in ritonavir** (uporablja se proti okužbi z virusom HIV – prosimo glejte poglavje Bodite posebno pozorni pri uporabi zdravila Coupet).

Zdravilo Coupet lahko spremeni učinke teh zdravil, prav tako lahko tudi ta zdravila spremenijo učinek zdravila Coupet.

### **Jemanje zdravila Coupet s hrano in pijačo**

Zdravilo Coupet lahko zaužijete s hrano ali brez nje.

### **Nosečnost in dojenje**

**Ne jemljite zdravila Coupet**, če ste noseči ali dojite. Če med jemanjem zdravila Coupet zanosite, **ga takoj nehajte jemati** in se posvetujte z zdravnikom. Ženske morajo z uporabo ustrezne kontracepcije poskrbeti, da med jemanjem zdravila Coupet ne zanosijo.

### **Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev**

Večina ljudi lahko med uporabo zdravila Coupet uporablja vozila in stroje – zdravilo ne bo poslabšalo njihove psihofizične sposobnosti. Nekaterim ljudem pa se med zdravljenjem z zdravilom Coupet pojavi omotica. Če se vam pojavlja omotica, se posvetujte zdravnikom, preden poskusite voziti ali upravljati stroje.

### **Pomembne informacije o nekaterih sestavinah zdravila Coupet**

Če vam je zdravnik povedal, da imate intoleranco za nekatere sladkorje (laktozo ali mlečni sladkor), se posvetujte z zdravnikom, preden vzamete zdravilo Coupet.

## **3. KAKO JEMATI ZDRAVILO COUPET**

Pri jemanju zdravila Coupet natančno upoštevajte zdravnikova navodila. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

### **Običajni odmerki pri odraslih**

**Če jemljete zdravilo Coupet za zdravljenje povišanega holesterola:**

#### **Začetni odmerek**

Vaše zdravljenje z zdravilom Coupet morate začeti z odmerkom 5 mg ali 10 mg, tudi če ste pred tem jemali katerikoli drug statin v večjem odmerku.

Izbira začetnega odmerka je odvisna od:

- ravni holesterola
- stopnje tveganja za srčni infarkt ali možgansko kap
- tega, ali imate kakšen dejavnik, ki lahko poveča vašo občutljivost za možne neželene učinke.

Z zdravnikom ali s farmacevtom preverite, kateri začetni odmerek zdravila Coupet je za vas najprimernejši.

Zdravnik se lahko odloči, da vam predpiše najmanjši odmerek (5 mg) če:

- ste azijskega porekla (Japonec, Kitajec, Filipinec, Vietnamec, Korejec ali Indijec)
- ste starejši od 70 let
- če imate zmerne težave z ledvicami
- če obstaja verjetnost pojava bolečin v mišicah (miopatija).

### **Povečanje odmerka in največji dnevni odmerek**

Zdravnik se lahko odloči, da vam poveča odmerek, tako da jemljete količino zdravila Coupet, ki je primerna za vas. Če ste pričeli zdravljenje z odmerkom 5 mg, se lahko zdravnik odloči, da vam podvoji odmerek na 10 mg, nato na 20 mg in nazadnje na 40 mg, če je to potrebno. Če ste pričeli zdravljenje z odmerkom 10 mg, se lahko zdravnik odloči, da vam podvoji odmerek na 20 mg in nato na 40 mg, če je potrebno.

Med vsako prilagoditvijo odmerka bo vedno štiritedenski presledek.

Največji dnevni odmerek zdravila Coupet je 40 mg. Namenjen je le bolnikom z visokim holesterolom in velikim tveganjem za srčni infarkt ali možgansko kap, ki jim 20 mg odmerka holesterola ne zniža dovolj.

### **Jemanje zdravila Coupet za zmanjšanje tveganja za srčni infarkt, kap ali podobne zdravstvene težave**

Priporočen odmerek je 20 mg dnevno. Kljub temu, pa se lahko vaš zdravnik odloči za zmanjšanje odmerka, če imate faktorje tveganja, ki so omenjeni zgoraj.

### **Običajen odmerek pri otrocih starih 10 – 17 let**

Običajen začetni odmerek je 5 mg. Zdravnik vam lahko poveča odmerek, da jemljete količino zdravila Coupet, ki je primerna za vas. Največji dnevni odmerek zdravila Coupet je 20 mg. Odmerek vzemite enkrat dnevno. Zdravilo Coupet **40 mg** se pri otrocih ne sme uporabljati.

### **Jemanje tablet**

Tableto pogoltnite celo z vodo.

Zdravilo Coupet vzemite enkrat na dan, lahko kadarkoli tekom dneva. Poskusite jih jemati vsak dan ob istem času, da si boste lažje zapomnili.

### **Redne kontrole holesterola**

Pomembno je, da pri zdravniku redno opravljate kontrole holesterola. Tako se boste prepričali, da je holesterol dosegel pravo koncentracijo in jo tudi ohranja.

Zdravnik vam lahko odmerek poveča z namenom, da boste jemali toliko zdravila Coupet, kot je za vas primerno.

### **Če ste vzeli večji odmerek zdravila Coupet, kot bi smeli**

Za nasvet se obrnite na najbližjega zdravnika ali najbližjo bolnišnico.

Če se zdravite zaradi drugih bolezni ali ste na zdravljenju v bolnišnici, morate povedati zdravstvenemu osebju, da jemljete zdravilo Coupet.

### **Če ste pozabili vzeti zdravilo Coupet**

Ne skrbite, preprosto vzemite naslednji predvideni odmerek ob pravem času. Ne vzemite dvojnega odmerka, da bi nadomestili izpuščenega.

### **Če ste prenehali jemati zdravilo Coupet**

Če želite nehati jemati zdravilo Coupet, se pogovorite s svojim zdravnikom. Če nehate jemati zdravilo Coupet, se vam holesterol lahko spet zviša.

## **4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI**

Kot vsak zdravila ima lahko tudi zdravilo Coupet neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Pomembno je, da se zavedate, da se lahko neželeni učinki pojavijo tudi pri vas. Običajno so mile oblike in izginejo v kratkem času.

**Nehajte jemati zdravilo Coupet in nemudoma poiščite medicinsko pomoč**, če imate katero od spodnjih alergijskih reakcij:

- težave z dihanjem, z ali brez oteklosti obraza, ustnic, jezika in/ali grla
- oteklost obraza, ustnic, jezika in/ali grla, ki lahko povzroči težave pri požiranju
- močno srbenje kože (z izbočenimi oteklinaami).

**Prav tako nehaite jemati zdravilo Coupet in se nemudoma posvetujte z zdravnikom, če imate ponavljajoče se ali nepojasnjene bolečine v mišicah, ki trajajo dlje časa kot bi pričakovali.** Simptomi povezani z mišicami so bolj pogosti pri otrocih in mladostnikih kot pri odraslih.

Tako kot pri drugih statinih je zelo majhno število bolnikov poročalo o neprijetnih učinkih na mišice; redko so se ti učinki stopnjevali v potencialno smrtno nevarno okvaro mišic, imenovano *rabdomioliza*.

**Pogosti neželeni učinki** (pojavijo se pri 1 do 10 bolnikih od 100 bolnikov)

- glavobol
- omotičnost
- zaprtje
- siljenje na bruhanje
- bolečine v želodcu
- bolečina v mišicah
- občutek šibkosti
- povečana količina beljakovin v urinu (nenormalni rezultati testa delovanja ledvic) – ta se navadno normalizira sama, ne da bi morali nehati jemati zdravilo Coupet (velja samo za zdravilo Coupet 40 mg).
- sladkorna bolezen, zlasti pri osebah, ki imajo krvni sladkor v zgornjih mejah “normale”

**Občasni neželeni učinki** (pojavijo se pri 1 do 10 bolnikih od 1.000 bolnikov)

- izpuščaj, srbečica ali druge kožne reakcije
- povečana količina beljakovin v urinu – ta se navadno normalizira sama, ne da bi morali nehati jemati zdravilo Coupet (velja samo za zdravilo Coupet 5 mg, 10 mg in 20 mg).

**Redki neželeni učinki** (pojavijo se pri 1 do 10 bolnikih od 10.000 bolnikov)

- hude alergijske reakcije – simptomi vključujejo oteklost obraza, ustnic, jezika in/ali grla, težave pri požiranju in dihanju, huda srbečica kože (z izbočenimi otekljami). **Če mislite, da imate alergijsko reakcijo prenehajte jemati zdravilo Coupet in takoj poiščite medicinsko pomoč.**
- okvara mišic pri odraslih – iz previdnosti **prenehajte jemati zdravilo Coupet in povejte svojemu zdravniku, če imate neobičajne bolečine** v mišicah, ki trajajo dlje kot ste pričakovali.
- hude bolečine v želodcu (vnetje trebušne slinavke)
- zvišanje ravni jetrnih encimov v krvi.

**Zelo redki neželeni učinki** (pojavijo se pri manj kot 1 bolniku od 10.000 bolnikov)

- zlatenica (porumenelost kože in oči)
- hepatitis (vnetje jeter)
- sledi krvi v urinu
- okvara živcev v nogah in rokah (npr. omrtvelost)
- bolečine v sklepih
- izguba spomina.

**Neželeni učinki neznane pogostnosti** (pogostnosti iz razpoložljivih podatkov ni mogoče oceniti)

- driska (mehko blato)
- hud pojav mehurjev na koži, sluznici ust, obeh in spolovilih (Stevens-Johnsonov sindrom)

- kašelj
- zasoplost
- edemi (otekanje)
- motnje spanja, vključno z nespečnostjo in nočnimi morami
- spolne težave
- depresija
- težave z dihanjem, vključno s trdovratnim kašljem in/ali zasoplostjo ali povišano telesno temperaturo

**Če kateri koli neželeni učinek postane resen ali če opazite kateri koli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.**

## **5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA COUPET**

Zdravila Coupet ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojninu poleg oznake EXP. Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca.

Shranjujte v originalni ovojninu za zagotovitev zaščite pred vlago.

Rok uporabnosti po prvem odprtju HDPE plastenke je največ tri mesece.

Zdravila ne smete zavreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne potrebujete več, se posvetujte s farmacevtom. Takšni ukrepi pomagajo varovati okolje.

## **6. DODATNE INFORMACIJE**

### **Kaj vsebuje zdravilo Coupet**

- Zdravilna učinkovina je rosuvastatin.

#### **Coupet 5 mg filmsko obložene tablete**

Ena filmsko obložena tableta vsebuje 5 mg rosuvastatina (v obliki kalcijevega rosuvastatinata).

#### **Coupet 10 mg filmsko obložene tablete**

Ena filmsko obložena tableta vsebuje 10 mg rosuvastatina (v obliki kalcijevega rosuvastatinata).

#### **Coupet 20 mg filmsko obložene tablete**

Ena filmsko obložena tableta vsebuje 20 mg rosuvastatina (v obliki kalcijevega rosuvastatinata).

#### **Coupet 40 mg filmsko obložene tablete**

Ena filmsko obložena tableta vsebuje 40 mg rosuvastatina (v obliki kalcijevega rosuvastatinata).

Pomožne snovi so:

Jedro tablete:

Brezvodna laktoza, brezvodni koloidni silicijev dioksid, silicizirana mikrokristalna celuloza, koruzni škrob, smukec, natrijev stearilfumarat

Obloga tablete:

hipromeloza, manitol E421, makrogol 6000, smukec, titanov dioksid E171, rumeni železov oksid E172, rdeči železov oksid E172

### **Izgled zdravila Coupet in vsebina pakiranja**

Filmsko obložene tablete

#### **Coupet 5 mg filmsko obložene tablete**

Svetlo rjave, okrogle, filmsko obložene tablete z oznako "RSV 5" na eni strani.

#### **Coupet 10 mg filmsko obložene tablete**

Rjave, okrogle, filmsko obložene tablete z oznako "RSV 10" na eni strani.

#### **Coupet 20 mg filmsko obložene tablete**

Rjave, okrogle, filmsko obložene tablete z oznako "RSV 20" na eni strani.

#### **Coupet 40 mg filmsko obložene tablete**

Rjave, okrogle, filmsko obložene tablete z oznako "RSV 40" na eni strani.

Zdravilo Coupet 5/10/20/40 mg filmsko obložene tablete je na voljo v:

- pretisnih omotih iz OPA-Al-PVC/Al s po 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 42, 50, 56, 60, 84, 98 ali 100 filmsko obloženimi tabletami

- HDPE platenkah s PP zaporko in sušilnim sredstvom iz silikagela. Plastenka vsebuje 30 ali 100 filmsko obloženih tablet

Na trgu ni vseh navedenih pakiranj.

### **Način in režim izdaje zdravila**

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

### **Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom**

Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

### **Izdelovalec:**

Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

Lek farmacevtska družba d.d., Trimlini 2D, Lendava, Slovenija

Lek S.A., ul. Domaniewska 50, 02-672 Warszawa, Poljska

Salutas Pharma GmbH, Dieselstrasse 5, 70839 Gerlingen, Nemčija

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Nemčija

**To zdravilo je v državah članicah EGP pridobilo dovoljenje za promet pod naslednjimi imeni:**

Bolgarija: Suzastor

|                     |                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Republika Češka:    | Rosumop 10 mg<br>Rosumop 20 mg<br>Rosumop 40 mg                                                                                                                                                                                     |
| Danska:             | Rosuvastatin Sandoz                                                                                                                                                                                                                 |
| Estonija:           | Roxardio 10mg<br>Roxardio 20mg                                                                                                                                                                                                      |
| Finska:             | Rosuvastatin Sandoz 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen<br>Rosuvastatin Sandoz 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen<br>Rosuvastatin Sandoz 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen<br>Rosuvastatin Sandoz 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen |
| Madžarska:          | Rosuvastatin Sandoz 10 mg filmtabletta<br>Rosuvastatin Sandoz 20 mg filmtabletta<br>Rosuvastatin Sandoz 40 mg filmtabletta                                                                                                          |
| Litva:              | Roxardio 5 m plėvele dengtos tabletės<br>Roxardio 10 m plėvele dengtos tabletės<br>Roxardio 20 m plėvele dengtos tabletės                                                                                                           |
| Poljska:            | Suvaradio                                                                                                                                                                                                                           |
| Portugalska:        | Rosuvastatina Sandoz<br>Rosuvastatin Sandoz tabletki powlekane 10 mg                                                                                                                                                                |
| Romunija:           | ROXARDIO 5 mg, comprimate filmate<br>ROXARDIO 10 mg, comprimate filmate<br>ROXARDIO 20 mg, comprimate filmate<br>ROXARDIO 40 mg, comprimate filmate                                                                                 |
| Republika Slovaška: | Rosuvastatin Sandoz 10 mg filmom obalené tablety<br>Rosuvastatin Sandoz 20 mg filmom obalené tablety                                                                                                                                |
| Slovenija           | Coupet 5 mg filmsko obložene tablete<br>Coupet 10 mg filmsko obložene tablete<br>Coupet 20 mg filmsko obložene tablete<br>Coupet 40 mg filmsko obložene tablete                                                                     |

**Navodilo je bilo odobreno**

10. 11. 2010